

4. 効能又は効果

シスプラチン通常療法

睾丸腫瘍、膀胱癌、腎盂・尿管腫瘍、前立腺癌、卵巣癌、頭頸部癌、非小細胞肺癌

A法：シスプラチンとして15～20mg / m²

²(体表面積)を5日間連続投与し、少なくとも2週間休薬する。クールとし、投与を繰り返す。

B法：シスプラチンとして50～70mg / m²(体表面積)を1日1回連続投与し、少なくとも1週間連続投与し、クールとし、投与を繰り返す。

E法：シスプラチンとして70～90mg / m²

²(体表面積)を1日1回連続投与し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

F法：シスプラチンとして20mg / m²(体表面積)を1日1回連続投与し、少なくとも2週間休薬する。これを1クールとし、投与を繰り返す。

G法：と混う 膈う莖 a 法【法 5 号 2 / え S

与を繰り返す。

なお、H法の投与量は症状により適宜減量する。

I法：シスプラチンとして25mg / m²

²(体表面積)を60分点滴静注し、週1回投与を2週連続し、3週目は休薬する。これを1クールとして投与を繰り返す。

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	シスプラチン 点滴静注 10mg「マルコ」	シスプラチン 点滴静注 25mg「マルコ」	シスプラチン 点滴静注 50mg「マルコ」
有効成分	1バイアル(20mL)中 シスプラチン 10mg	1バイアル(50mL)中 シスプラチン 25mg	1バイアル(100mL)中 シスプラチン 50mg
添加剤	1バイアル中 等張化剤(塩化ナトリウム) pH調節剤(塩酸)		

3.2 製剤の性状

	シスプラチン 点滴静注 10mg「マルコ」	シスプラチン 点滴静注 25mg「マルコ」	シスプラチン 点滴静注 50mg「マルコ」
剤形・性状	水性注射剤 無色～微黄色澄明の液		
pH	2.0～5.5		
浸透圧比			

